Ch. 1°. 2°. **N°. 44** par M. Le directeur

Mlle Royée de 49 ans, grande et de constitution assez robuste, avoit joui d'une bonne santé jusqu'a l'age de 45 ans. Vers ce temps elle eut pour la premiere fois, une inflammation de bas ventre quelques saignées et autres remedes convenables calmerent. Dans l'espace des quatre années suivantes elle eut encore plusieurs autres inflammations — aux quelles on apporta les memes secours.

Au mois de may 1751. la malade s'apperçeut d'un gonflement sensible dans le bas ventre, sentit une pesanteur vers le bassin accompagnée — d'etouffements assez fréquents: Il n'y avoit cependant aucune suppression, les regles couloient meme avec plus d'abbondance que de coutume.

En examinant la malade on trouva une tumeur, située dans le bassin, paroissant tenir au fond de la matrice. Elle s'etendoit sur les coté vers les ligaments larges et s'elevoit presque jusqu'a — l'ombilic.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N°
N° 74
ARC 23 n° 30 (a)
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

cette tumeur n'étoit point fixée, car dans les différentes situations que prenoit la malade, elle changeoit aussi de position.

au toucher, elle paroissoit d'une consistance charnue et vraiment schirreuse

au mois d'avril dernier il survint à la malade un vomissement qui dura soixante heures ; elle eut aussi d'abboundantes évacuations par les selles accompagnées de fréquentes syncopes.

Les matieres qu'elle rendit tant par haut que par bas, etoient fluides, d'une couleur noiratre et d'une odeur insupportable.

quand ces accidents furent cessés, la malade ne trouva plus sa tumeur ; elle se crut guerie ; mais quinze jours après elle reparut telle qu'elle etoit auparavant.

à la fin de novembre dernier la malade eut encore des évacuations semblables aux premieres, mais moins abboundantes, sans etre accompagnées de pertes de connoissance.

Dés que ces évacuations furent cessées, il survint au bras droit, à la jambe et à la cuisse gauche, un gonflement œdemateux avec des taches assez larges d'un rouge brun pareilles aux taches scorbutiques: ces accidents se dissiperent en peu de jour par un petit dévoyement et la tumeur disparut une seconde fois

Le 22 decembre, en examinant le lieu ou avoit eté la tumeur, on sentoit, malgré l'épaisseur des tegumens, quelque chose de pateux, comme un kiste vuide et froncé

Dans l'espace de douze jours, ce qui etoit applati s'éleva insensiblement et acquit ~~[illegible]~~ une figure presque spheroïdale

voila ou finit le recit que l'on nous fit de la maladie

Je distinguay alors un peu de fluide dans le kiste mais ne crus pas qu'il fut possible de le vuider par la ponction parce qu'il n'etoit pas assez plein. et au bout de 11 jours il l'etoit assez et j'y fis la ponction par la quelle il sortit 4 pintes d'une

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Eau claire et un peu rouge. ~~[illegible]~~ Je laissay dans la playe une canulle qui se perdoit dans le kiste et pendant 4 jours que la malade vecut, il sortit encor presque autant de liqueur et l'ouverture du corps nous avons trouvé le kiste que voicy, dans le quel les deux ovaires etoient enfermes

Idropisie enkistée. J'ay montré aussi le kiste a ~~[illegible]~~ l'Academie le jauv. 1753